Э.Ю. Соловьева

ГБОУ ВПО «Российский национальный медицинский университет им. Н.И. Пирогова», Москва

Терапия болевого синдрома в спине

Прямое нейротропное и анальгезирующее действие витаминов группы В определяет целесообразность их использования в лечении болевых синдромов. Обосновано использование нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) в комбинации с витаминами группы В. По данным ряда независимых исследований, витамины группы В потенцируют обезболивающий эффект НПВП и способствуют более быстрому регрессу болевого синдрома, чем монотерапия НПВП. Для снижения риска побочных явлений терапии НПВП, повышения приверженности лечению и уменьшения его стоимости целесообразно использовать комбинированные препараты, содержащие данные компоненты и позволяющие снижать дозу активных веществ за счет их синергизма. Новый комбинированный препарат нейродикловит содержит кишечнорастворимые гранулы диклофенака с замедленным высвобождением и отдельные гранулы витаминов В₁, В₆, В₁₂ с немедленным высвобождением. Включение препарата нейродикловит в схемы лечения болевых синдромов в спине будет способствовать оптимизации терапии.

Ключевые слова: болевые синдромы, нестероидные противовоспалительные препараты, витамины группы В, синергизм действия.

Контакты: Элла Юрьевна Соловьева ellasolovieva@yandex.ru

Therapy for back pain syndrome

E. Yu. Solovyeva

N.I. Pirogov Russian National Research Medical University, Moscow

The direct neurotropic and analgesic activities of B group vitamins determine the expediency of their use in the treatment of pain syndromes.

There is evidence that nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) may be used in combination with B group vitamins. A number of independent trials demonstrates that B group vitamins potentiate the analgesic effect of NSAIDs and contribute to a rapid regression of pain syndrome than their monotherapy. To reduce the risk of adverse reactions of NSAID therapy, to enhance its adherence, and to reduce its cost, it is reasonable to administer combination drugs that contain these components and allow the dose of active substances to be decreased due to their synergism. The new combination drug neurodiclovit contains slow-release enteric-coated granules and individual immediate-release granules of vitamins B₁, B₆, and B₁₂. Incorporation of neurodiclovit into treatment regimens for back pain syndromes will promote optimization of their therapy.

Key words: pain syndromes, nonsteroidal anti-inflammatory drugs, group B vitamins, synergism of action.

Contact: Ella Yuryevna Solovyeva ellasolovieva@yandex.ru

С клинической точки зрения для терапии болевого синдрома в спине ведущее значение имеют выявление источника болевой импульсации и проведение дифференциальной диагностики с заболеваниями внутренних органов, онкологическим, травматическим, инфекционным и другими процессами. Успех диагностики зависит от принципиального рассмотрения данных анамнеза, жалоб больного, подробного осмотра с использованием диагностических приемов, параклинических методов исследования. Дегенеративно-дистрофическая перестройка структур позвоночника, чаще всего обуславливающая болевой синдром в спине, длительное время протекает бессимптомно. Обнаружение этих изменений при рентгенографии, особенно у пациентов молодого и среднего возраста, не является безусловным доказательством вертеброгенной причины боли в спине и не должно определять лечебную тактику. Более того, боль в спине может быть обусловлена другими заболеваниями позвоночника, не связанными с его дегенеративным поражением [1].

К «опасным» симптомам, маскированным под вертеброгенную патологию, относятся нетипичная картина болевого синдрома (отсутствие связи боли с движениями

позвоночника; необычная локализация боли); наличие в анамнезе недавней травмы спины или злокачественного новообразования; лихорадка; симптомы интоксикации; симптомы нарушения функции тазовых органов или поражения спинного мозга либо корешков конского хвоста; признаки психического заболевания, при котором боль в спине может быть проявлением соматоформного расстройства [2].

Более чем у 85% пациентов с острой болью в спине выявляются ее скелетно-мышечные причины. Предположительно микротравматизация и растяжение мышцы при выполнении «неподготовленного движения» являются причиной боли у подавляющего большинства пациентов (более 70%). Боль, связанная с дисфункцией дугоотростчатых (фасеточных) суставов, отмечается у 10% пациентов. На долю компрессионной радикулопатии пояснично-крестцовых корешков приходится около 4% случаев острой боли в спине. Компрессионные переломы тел позвонков, связанные с остеопорозом, обнаруживаются у 4% больных, а спондилолистез — у 2% [2].

Типичная клиническая картина скелетно-мышечной боли в поясничной (люмбалгия), шейной (цервикал-

гия) и грудной (торакалгия) области характеризуется болью, возникающей после неловкого движения, интенсивной физической или статической нагрузки. Обычно боль носит ноющий характер, усиливается при движении с участием заинтересованных мышц и (или) отделов позвоночника, в определенных позах. При обследовании выявляют анталгическую позу, ограничение подвижности из-за усиления боли, напряжение мышц спины, болезненность при пальпации мышц и/или области фасеточных суставов. Неврологическая симптоматика в виде парезов, расстройств чувствительности и выпадения рефлексов отсутствует.

При радикулопатии боль чаще простреливающая. Помимо изменений, обнаруживаемых при скелетно-мышечной патологии, в таких случаях выявляют чувствительные, рефлекторные и реже двигательные нарушения в зоне пораженного корешка. Чаще поражаются нижние поясничные и первый крестцовый корешки, реже — нижние шейные и верхние поясничные.

При дорсопатии важно установить источник болевой импульсации, локализацию морфологического субстрата болевых ощущений. Боль может исходить как из позвоночника, так и других структур: суставов, связок, мышц, периферических нервов, нервных корешков, чувствительных и вегетативных ганглиев, спинного мозга. Независимо от источника болевого импульса, каскад патофизиологических и регуляторных процессов затрагивает всю ноцицептивную систему — от тканевых рецепторов до корковых нейронов. Его можно представить в виде следующей схемы: раздражение ноцицепторов при повреждении тканей — выделение аллогенов и сенсибилизация ноцицепторов в области повреждения — усиление ноцицептивного афферентного потока с периферии — сенсибилизация нейронов на различных уровнях ЦНС. В связи с этим патогенетически обоснованным считается применение средств, направленных, во-первых, на ограничение поступления ноцицептивной импульсации из зоны повреждения в ЦНС (блокады местными анестетиками), во-вторых, на подавление синтеза медиаторов воспаления (нестероидные противовоспалительные препараты — НПВП), в-третьих, на активизацию структур антиноцицептивной системы, осуществляющей контроль за проведением ноцицептивной импульсации в ЦНС. Для этого может быть использован целый спектр (в зависимости от клинической задачи) медикаментозных и немедикаментозных средств, снижающих болевую чувствительность и негативное эмоциональное переживание: наркотические и ненаркотические анальгетики, бензодиазепины, агонисты альфа₂-адренорецепторов, чрескожная электронейростимуляция, рефлекс-, физио-, психотерапия и др. [3, 4].

Кроме того, терапия дорсопатии требует индивидуального и комплексного подхода с учетом фазы патологического процесса. При развитии острого болевого синдрома рекомендуется его быстрое купирование, поскольку правильное и адекватное лечение острой боли в первые дни снижает вероятность перехода ее в хроническую. Итогом адекватного и своевременного выбора анальгезии являются сокращение срока пребывания на больничном листе, более быстрое возвращение трудоспособности, уменьшение степени инвалидизации, профилактика формирования «болевого памяти».

При хроническом течении боли в спине могут быть эффективны лечебная гимнастика, физиотерапевтические методы, миорелаксанты, антидепрессанты, мануальная терапия и психотерапия.

Препараты первой линии при лечении болевых синдромов любой степени выраженности — НПВП. После выделения из коры ивы салициловой кислоты в 1829 г. и создания аспирина НПВП прочно заняли место в терапии боли или воспаления. Их широкую распространенность обеспечило и отсутствие побочных эффектов, присущих опиатам: седации, угнетения дыхания и привыкания. Большинство НПВП считаются достаточно безопасными.

За последние 30 лет количество НПВП значительно увеличилось, и в настоящее время данная группа насчитывает большое число препаратов, отличающихся по химической структуре, особенностям действия и применения.

Наиболее важным механизмом действия НПВП является способность ингибировать циклооксигеназу (ЦОГ) — фермент, катализирующий превращение свободных полиненасыщенных жирных кислот в простагландины (ПГ), а также другие эйкозаноиды — тромбоксаны (ТхА₂) и простациклин (ПГІ₂). Доказано, что ПГ имеют многостороннюю биологическую активность: являются медиаторами воспалительной реакции; сенсибилизируют рецепторы к медиаторам боли (гистамину, брадикинину) и механическим воздействиям, понижая порог чувствительности; повышают чувствительность гипоталамических центров терморегуляции к действию эндогенных пирогенов (интерлейкина 1 и др.), играют важную физиологическую роль в защите слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта; влияют на функцию почек.

Основное негативное свойство всех НПВП, связанное с угнетением синтеза ПГ и эйкозаноидов, — высокий риск развития нежелательных реакций со стороны желудочно-кишечного тракта, почек, печени, сосудов, бронхолегочной системы.

Сравнение селективной анальгезирующей активности по отношению к степени подавления синтеза ПГ показало, что некоторые НПВП с сильными анальгетическими свойствами являются слабыми ингибиторами синтеза ПГ и, наоборот, НПВП, способные активно ингибировать синтез ПГ, обладают слабыми анальгезирующими свойствами. Таким образом, наблюдается диссоциация между анальгезирующей и противовоспалительной активностью НПВП. Этот феномен объясняется тем, что анальгетическое действие некоторых НПВП связано не только с подавлением синтеза центральных и периферических ПГ, но и с влиянием на синтез и активность других нейрональных веществ, играющих ключевую роль в восприятии болевого раздражения в ЦНС.

Механизм анальгетического действия складывается из нескольких компонентов, каждый из которых может иметь самостоятельное значение. Некоторые ПГ (E₂ и F_{2a}) способны повышать чувствительность болевых рецепторов к физическим и химическим стимуляторам, например к действию брадикинина, который в свою очередь способствует высвобождению ПГ из тканей. Таким образом, происходит взаимное усиление аллогенного эффекта. НПВП, блокируя синтез ПGE₂ и PGF_{2a}, в сочетании с прямым антибрадикининовым действием препятствуют проявлению аллогенного эффекта.

Хотя НПВП не действуют на болевые рецепторы, блокируя экссудацию, стабилизируя мембраны лизосом, они опосредованно снижают число рецепторов, чувствительных к химическим раздражителям. Определенное значение придается влиянию этой группы препаратов на таламические центры болевой чувствительности (локальная блокада ПГЕ₂, ПГФ_{2α} в ЦНС), которое приводит к торможению проведения болевых импульсов к коре. При воспалении диклофенак, индометацин по анальгетической активности не уступают наркотическим анальгетикам и при этом не влияют на способность ЦНС к суммации подпороговых раздражений.

Аналгезирующий эффект НПВП в большей степени проявляется при боли слабой и средней интенсивности, которая локализуется в мышцах, суставах, сухожилиях, нервных стволах, а также при головной или зубной боли. При сильной висцеральной боли, связанной с травмой, операцией, опухолью, большинство НПВП менее эффективны, чем наркотические анальгетики. В то же время в ряде контролируемых исследований показана достаточно высокая анальгетическая активность диклофенака, кеторолака, кетопрофена, метамизола при коликах и послеоперационной боли. Эффективность НПВП при почечной колике, возникающей у больных с мочекаменной болезнью, во многом связана с торможением продукции ПГЕ₂ в почках, снижением почечного кровотока и образованием мочи. Это ведет к уменьшению давления в почечных лоханках и мочеточниках выше места обструкции и обеспечивает длительный аналгезирующий эффект.

В 1966 г. в исследовательской лаборатории фирмы Geigy A. Sallmann получил высокоактивное вещество GP 45840, которое вошло в историю под названием «диклофенак». В экспериментах на животных было показано, что это вещество обладает выраженными обезболивающими, противовоспалительными и жаропонижающими свойствами. После многочисленных рандомизированных клинических исследований были доказаны его высокая эффективность и хорошая переносимость, что сделало диклофенак «золотым стандартом» при лечении многих заболеваний.

Механизм действия диклофенака связан со сбалансированным действием на ЦОГ 1 и ЦОГ 2. Так, по сравнению с ибупрофеном и напроксеном он меньше влияет на ЦОГ 1, в связи с чем реже вызывает поражение желудочно-кишечного тракта, но в то же время действие на ЦОГ 1 объясняет его большую эффективность по сравнению с селективными ингибиторами ЦОГ 2 (мелоксикам, целекоксиб). Влияние на ЦОГ 2 у диклофенака меньше, чем у эторикоксиба и рофекоксиба, что обуславливает уменьшение риска сердечно-сосудистых осложнений [5].

Существуют ЦОГ-независимые анальгетические механизмы диклофенака — активация нескольких типов калиевых каналов, происходящая с участием NO и цикло-ГМФ на периферическом уровне [6, 7], и воздействие на опиоидные рецепторы посредством влияния на обмен триптофана на центральном уровне [8, 9].

Для улучшения переносимости НПВП используют ЦОГ 2-селективные препараты, лекарственные формы с ЦОГ-независимым механизмом действия (селективный антагонизм простагландиновых, NO-рецепторов), а также препараты, направленные на защиту слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта (цитопротекторы, блокаторы

H₂-гистаминовых рецепторов, ингибиторы протонной помпы, синтетические аналоги ПГ) и улучшающие микроциркуляцию и потенцирующие противовоспалительное действие НПВП, — пентоксифиллин (вазонит, трентал), антиоксиданты (витамины E, C).

Улучшению переносимости НПВП способствует также назначение минимальных эффективных доз в сочетании со средствами, усиливающими их аналгезирующее действие.

В клинической практике с целью усиления противовоспалительного и анальгетического действия иногда прибегают к комбинированному применению двух и более НПВП. По мнению А.Г. Вознесенского [10], в большинстве случаев это является необоснованным, так как эффективность таких комбинаций объективно не доказана; в ряде подобных случаев отмечается снижение концентрации препаратов в крови (например, аспирин снижает концентрацию индометацина, диклофенака, ибупрофена, напроксена, пироксикама), что ведет к ослаблению эффекта; возрастает опасность развития нежелательных реакций.

С этой точки зрения более перспективно использование НПВП в комбинации с витаминами группы B. По данным ряда независимых исследований, витамины группы B потенцируют обезболивающий эффект НПВП и способствуют более быстрому регрессу болевого синдрома, чем при терапии только НПВП [11–16].

Прямое нейротропное и аналгезирующее действие витаминов группы B определяет целесообразность их назначения при болевых синдромах. Так, витамин B₁ (тиамин) участвует в синтезе нейромедиаторов и улучшает проведение нервных импульсов, обеспечивает аксональный транспорт, определяющий регенерацию нервной ткани.

Витамин B₆ (пиридоксин) включен в биосинтез белка, обеспечивает синаптическую передачу, нормализует соотношение процессов возбуждения и торможения в ЦНС, способствуя поддержанию достаточного уровня микроциркуляции в тканях.

Витамин B₁₂ (цианкобаламин), кроме участия в процессах кроветворения, блокирует синтез медиаторов воспаления и боли, усиливает эффект антиноцицептивной системы, в том числе и благодаря улучшению обмена серотонина, способствует миелинизации нервных волокон.

Возможно одновременное назначение витаминов группы B и НПВП, однако для снижения риска развития побочных явлений, повышения комплаентности и уменьшения стоимости лечения целесообразно использование комбинированных препаратов, содержащих данные компоненты и позволяющих снижать дозу активных веществ за счет взаимного синергизма.

Сравнительно недавно на отечественном фармацевтическом рынке появился комбинированный препарат нейродикловит, который представляет собой капсулу, содержащую кишечнорастворимые гранулы диклофенака с замедленным высвобождением и отдельные гранулы витаминов B₁, B₆, B₁₂ с немедленным высвобождением.

Одна капсула нейродикловита содержит 50 мг диклофенака натрия и 50 мг тиамина гидрохлорида, 50 мг пиридоксина гидрохлорида и 0,25 мг цианкобаламина.

Показаниями для использования нейродикловита в неврологической практике являются болевой синдром при

воспалительных и дегенеративных заболеваний суставов и позвоночника (хронический полиартрит, остеоартроз, спондилоартроз); дорсопатия (цервикалгия, люмбаго, люмбоишиалгия); острый подагрический артрит.

Высокая эффективность данной комбинированной формы оценена в ряде двойных слепых плацебоконтролируемых исследований при боли в спине [13, 15, 17, 18].

В отечественной литературе представлены результаты исследований анальгезирующей эффективности нейродикловита при анкилозирующем спондилоартрите, остеоартрозе коленных суставов, дорсалгии, постишемических невритах [19–23]. Показан благоприятный профиль эффективности и безопасности препарата. Схема назначения нейродикловита в дозе 1 капсула 3 раза в сутки в течение 2 нед характеризовалась хорошей переносимостью [20, 21]. Серьезных нежелательных явлений не отмечено. У больных с анкилозирующим спондилоартритом применение нейродикловита достоверно уменьшало выраженность боли, длительность утренней скованности, увеличивало степень активности по индексу

BASDAI и функциональной способности по индексу BASFI [22]. При остром болевом синдроме у больных с грыжей межпозвоночного диска нейродикловит достоверно уменьшал выраженность боли и улучшал показатели жизнедеятельности, при этом по степени анальгезирующего эффекта он значительно превосходил монотерапию диклофенаком [19, 23].

У больных, получавших ранее 100 мг/сут диклофенака, удалось сохранить клинический эффект при приеме 1 капсулы нейродикловита [22].

Итак, главный принцип лечения боли в спине — рациональная полифармакотерапия. Купировать боль в спине с помощью одного препарата удается далеко не во всех случаях. При назначении препаратов важен баланс между их эффективностью и нежелательными эффектами, а при комбинированной терапии необходимо учитывать фармакокинетику и возможность их взаимодействия. Включение нейродикловита в схемы лечения болевых синдромов в спине будет способствовать оптимизации лечения таких пациентов.

ЛИТЕРАТУРА

- Черненко О.А. Клинические и МР-томографические характеристики вертебренов-рологических нарушений в различных возрастных группах. Автореф. дисс. ... канд. мед. наук. М., 1996.
- Подчуфарова Е.В., Яхно Н.Н. Боли в спине и конечностях. В кн.: Болезни нервной системы. Рук-во для врачей. Под ред. Н.Н. Яхно. Т. 2. М.: Медицина, 2005: 306–31.
- Haldeman S. Low back pain. Current physiologic concepts. *Neurol Clin* 1999;17(1):1–15.
- Wall P., Melzack R. Textbook of pain. 4th Ed. Edinburgh: Churchill Livingstone, 1999; 1143–53.
- Grosser T., Fries S., FitzGerald G.A. Biological basis for the cardiovascular consequences of COX-2 inhibition: therapeutic challenges and opportunities. *J Clin Invest*. 2006;116:4–15.
- Tonussi C.R., Ferreira S.H. Mechanism of diclofenac analgesia: direct blockade of inflammatory sensitization. *Eur J Pharmacol* 1994;251(2–3):173–9.
- Liu L.Y., Fei X.W., Li Z.M. et al. Diclofenac, a nonsteroidal anti-inflammatory drug, activates the transient outward K⁺ current in rat cerebellar granule cells. *Neuropharmacology* 2005;48(6):918–26.
- Bjorkman R.L., Hedner T., Hallman K.M. et al. Localization of the central antinociceptive effects of diclofenac in the rat. *Brain Res* 1992;590(1–2):66–73.
- Mahdy A.M., Galley H.F., Abdel-Wahed M.A. et al. Differential modulation of interleukin-6 and interleukin-10 by diclofenac in patients undergoing major surgery. *Br J Anaesth* 2002;88(6):797–802.
- Вознесенский А. Г. Клиническая фармакология нестероидных противовоспалительных средств. Волгоград, 1999; 186 с.
- Данилов А.Б. Применение витаминов группы В при болях в спине: новые анальгетики? *РМЖ* 2008;16 (спецвыпуск):35–9.
- Bromm K., Herrmann W.M., Schulz H. Do the B-vitamins exhibit antinociceptive efficacy in men? Results of a placebo-controlled study. *Neuropsychobiology* 1995;31:156–65.
- Bruggemann G., Koehler C.O., Koch E.M. Results of a double-blind study of diclofenac + vitamin B1, B6, B12 versus diclofenac in patients with acute pain of the lumbar vertebrae. A multicenter study. *Klin Wochenschr* 1990;19:116–20.
- Khan T.A., Ahmad A., Haider I.Z. Treatment of acute lumbago; low dose diclofenac sodium with vitamin-B complex compared with diclofenac alone. *Prof Med J* 2008;15:440–4.
- Kuhlwein A., Meyer H.J., Koehler C.O. Reduced diclofenac administration by B vitamins: results of a randomized double-blind study with reduced daily doses of diclofenac (75 mg diclofenac versus 75 mg diclofenac plus B vitamins) in acute lumbar vertebral syndromes. *Klin Wochenschr* 1990;19:107–15.
- Lettko M. Additive clinical efficacy of B-vitamins orally co-administered with NSAID diclofenac. In: B-Vitamins in Pain. Ed. by H.U. Gerbershagen, M. Zimmermann. Frankfurt: PMI Verlag, 1988; 50–4.
- Mibielli M.A., Geller M., Cohen J.C. et al. Diclofenac plus B vitamins versus diclofenac monotherapy in lumbago: the DOLOR study. *Curr Med Res Opin* 2009;25:2589–99.
- Vetter G., Bruggemann G., Lettko M. et al. Shortening diclofenac therapy by B vitamins. *Z Rheumatol* 1988;47:351–62.
- Камчатнов П.Р., Бойко А.Н., Батышева Т.Т. и др. Нейродикловит: возможность применения у пациентов с болью в спине. *Фарматека* 2010;7:63–8.
- Красивина И.Г., Носкова Т.С., Заводчиков А.А. Применение фиксированной комбинации диклофенака с витаминами группы В при остеоартрозе коленных суставов. *Фарматека* 2011;5:86–90.
- Зудин А.М., Багдасарян А.Г. Опыт лечения постишемических невритов у больных хронической критической ишемией нижних конечностей. *Фарматека* 2009;7:70–2.
- Немцов Б.Ф., Михайлова Н.Ю., Коцепалов А.Н. Первый опыт применения Нейродикловита при анкилозирующем спондилоартрите. *Атмосфера. Нервные болезни* 2009;3:27–30.
- Юдельсон Я.Б., Рачин А.П., Белогорохов О.О. Эффективность и безопасность применения препарата нейродикловит при дорсалгии. *Фарматека* 2008;20:132–5.